

tous les trois ne sont que des races d'une même espèce. Je n'ai pu trouver de caractères distinctifs entre elles.

Gymnetis holosericea Herbst (= *Mathani* Pouill., p. 237, = *distincta* Pouill., p. 391, = *chanchamayensis* Pouill., p. 393). — Le *G. holosericea* est très variable de coloration et de dessin. La teinte est tantôt noire, tantôt olivâtre, et la forme ou les dimensions des taches jaunes varient; souvent, au lieu de taches, les élytres ont une bordure jaune. Dans la même localité, les poils du dessous du corps sont tantôt noirs, tantôt roux.

Gymnetis cincta Perty (= *limbolaniata* Pouill., p. 393).

Trigonophorus Riaultii Fairm. (= *Trigonophorus Lemeei* Pouill., p. 43).

Les autres espèces de POULLAUDE sont très vraisemblablement aussi des synonymes ou des variétés d'espèces connues, mais pour s'en assurer, il faudrait voir les *types*.

Coléoptères nouveaux de la faune tunisienne (7^e note) (1)

par le Dr H. NORMAND.

STAPHYLINIDAE

Paraleptusa punica, n. sp. — Ferrugineux foncé, avec les segments intermédiaires de l'abdomen presque noirs; antennes et pattes plus claires; dessus très finement alutacé et couvert d'une pubescence fine, clairsemée, plus ou moins couchée. Tête arrondie latéralement, à ponctuation imperceptible, en série irrégulière de chaque côté de la ligne médiane, yeux punctiformes, tempes très dilatées, front légèrement déprimé. Antennes à deux premiers articles plus longs que larges; 3^e plus étroit, en cône renversé; les suivants de même longueur, mais devenant de plus en plus larges et transverses; dernier conique, égalant presque les trois précédents réunis. Corselet à ponctuation fine et obsolète, cilié sur les bords, carré ou à peine transverse, rétréci d'avant en arrière, avec les angles fortement arrondis, les bords antérieur et postérieur très légèrement convexes. Élytres

(1) Cf. *Bull. Soc. ent. Fr.* [1909, passim, 1910, 1911, 1912].

alutacés, à ponctuation fine, espacée, granuleuse, de même largeur que la tête, moitié plus courts et un peu plus étroits que le corselet, élargis à l'extrémité, où ils sont obliquement coupés. Abdomen légèrement dilaté à l'extrémité, brillant, testacé à la base et au sommet, presque lisse avec quelques fins granules épars.

♂. Corselet légèrement déprimé dans sa partie médiane; élytres plus fortement granuleux, surtout près de la suture, qui est de ce fait un peu surélevée; deux derniers segments dorsaux de l'abdomen à granules plus serrés et devenant tuberculeux en avant. — Long. 2 mm.

Tunisie : Fernana, Souk-el-Arba, Tebourouk, Fondouk-Djedid, Le Kef. — Commun sous les pierres et en criblant les détritux végétaux.

Cette espèce avait été méconnue autrefois par FAUVEL et rapportée par lui à son *P. dayensis*. Grâce à l'amabilité de mon ami M. P. DE PEYERIMHOFF, j'ai pu la comparer à des exemplaires *typiques* de cette espèce et constater qu'elle s'en distingue nettement, de même que des autres espèces du genre, par son abdomen rembruni au milieu, son corselet rétréci en arrière, ses caractères sexuels, etc.

CURCULIONIDAE

***Alaocyba elongatula*, n. sp.** — Allongé, parallèle, presque filiforme, assez convexe, ferrugineux, avec les antennes et les pattes plus claires. Pubescence éparse, composée de poils courts, dressés, un peu plus longs sur le rostre et les bords du prothorax. Rostre court, épais, légèrement arqué, ponctué et rugueux en dessus, alutacé en dessous, séparé de la tête par un étranglement assez prononcé; sillons antennaires peu profonds et écartés l'un de l'autre à la partie inférieure du rostre. Scape des antennes allongé, atteignant le bord antérieur du corselet; funicule de six articles, le premier carré, plus épais, les suivants petits, transverses; massue ovalaire, égalant les 3 derniers articles du funicule. Corselet allongé, de même largeur ou un peu plus étroit que les élytres, rétréci en avant et en arrière, sa plus grande largeur ordinairement au tiers antérieur, assez convexe, légèrement déprimé sur le dos, à ponctuation fine, obsolète, éparse, disposée vaguement en séries de chaque côté de la ligne médiane qui est lisse et plane. Élytres rugueux, parallèles, cylindriques, à peine déprimés dans leur partie dorsale, à points allongés, obsolètes, vaguement disposés en ligne et perdus dans les rugosités superficielles de la surface élytrale, extrémité arrondie, peu abrupte. — Prosternum striolé en travers, présentant parfois deux petites fossettes à son bord antérieur, stries latérales divergentes et non droites comme chez

le *Theryi* Meyer. Métasternum court, convexe, abaissé en arrière; 1^{er} et 2^e segments abdominaux soudés, très allongés, le 1^{er} présentant à la base une série de gros points ordinairement bien marqués, accompagnant la courbe du métasternum; surface faiblement alutacée, à ponctuation clairsemée, obsolète; milieu fortement déprimé chez le mâle, de même que la partie médiane du dernier segment abdominal; 3^e et 4^e segments formant une excavation transversale profonde. Fémurs en massue; tibias antérieurs élargis à l'extrémité, à bord externe légèrement anguleux au milieu, tibias postérieurs fortement élargis et présentant au tiers inférieur du bord externe une échancrure garnie d'une pilosité longue et fournie; tarses à pubescence courtes et nullement sétiforme comme chez le *Theryi* Meyer. — Long. 1,3-1,5 mm.

Tunisie : Nebeur, une série d'exemplaires en criblant les racines de lentisques, mars 1914.

***Alaocyba coniceps*, n. sp.** — Testacé, déprimé, assez allongé, pubescence formée de petits poils dressés, à peine visibles de profil. Tête allongée, remarquable par sa surface lisse et brillante à peine ponctuée et par sa forme dessinant un cône à sommet situé à l'insertion des antennes. Rostre se confondant avec la tête, un peu dilaté à partir de l'insertion antennaire, lisse et brillant en dessus, ruguleux en dessous; sillons antennaires courts et obsolètes. Antennes à scape très allongé en forme de massue; funicule très court, formé de six articles, le premier plus volumineux, conique, les suivants courts et très transverses; massue en ovale allongé. Corselet très déprimé, un peu plus long que large, rétréci davantage en arrière qu'en avant, sa plus grande largeur au tiers antérieur; surface lisse et brillante, avec quelques points épars et une série de points plus forts de chaque côté de la ligne médiane, celle-ci relevée dans ses deux tiers postérieurs et bordée de deux petites fossettes longitudinales. Élytres déprimés, couverts de rugosités superficielles, à ponctuation peu visible, la troisième série de points seule assez bien indiquée. Prosternum couvert de rides transversales, le reste du dessous grossièrement alutacé, à sculpture formant une espèce de réseau. 1^{er} et 2^e segments abdominaux à peine déprimés au centre; 3^e, enfoncé, sinué à son bord postérieur; 4^e déprimé au milieu de son bord antérieur. Pattes assez robustes, les fémurs en massue allongées, les tibias présentant les caractères du genre, antérieurs simples, postérieurs aplatis, ayant leur bord externe échancré vers le tiers inférieur; l'échancrure garnie d'une lame de pubescence soyeuse peu fournie. — Long. 1,1 mm.

Tunisie : Fernana.

Deux exemplaires sous une grosse pierre enfoncée, avril 1912.

Les deux espèces d'*Alaocyba* ci-dessus se distingueront facilement des deux autres espèces connues par leur surface élytrale couverte de rugosités et sans interstrie relevé. En outre, *A. elongatula* se reconnaîtra à sa forme étroite, cylindrique, peu déprimée; *A. coniceps* à la conicité de sa tête et à l'exiguïté remarquable de sa taille.

La découverte de ces deux espèces montre que le genre *Alaocyba* n'est pas aussi restreint qu'on aurait pu le penser a priori; il est même probable qu'il doit être représenté dans le Nord de l'Afrique par de nombreuses espèces que des recherches ultérieures feront sans doute découvrir.

Nouveaux *Nemostira* Fairm. asiatiques

[COL. HETEROMERA]

par Maurice Pic.

***Nemostira thibetana*, n. sp.** — *Satis lata, nitida, griseo pubescens, nigro-metallica, pro parte viridescens, elytris viridi-metallicis.*

Assez large, brillant, orné d'une pubescence grise, longue, en partie redressée, noir métallique à reflets verts sur le prothorax et en dessous du corps, élytres d'un vert métallique, membres noirs. Tête pas très longue, à ponctuation forte et écartée; prothorax un peu plus long que large, un peu étranglé vers la base avec les angles postérieurs sailants, à ponctuation forte, écartée; élytres bien plus larges que le prothorax, subparallèles, acuminés au sommet, à ponctuation irrégulière plus ou moins rapprochée, pas très forte, entremêlée de rides transversales; pattes grêles. Long. 17 mm.

Thibet (coll. Pic).

Voisin de *N. semiviridis* Pic, en diffère entre autres caractères par la forme plus large, le prothorax plus robuste, la ponctuation irrégulière des élytres et les pattes entièrement foncées.

***Nemostira rugipennis* var. *Ferriei*, n. var.** — *Nigra, elytris testaceis.*

Japon : Ile Oshima (FERRIE, in coll. Pic et Muséum de Paris).